

RYSTIGGO[®]

(rozanolixizumab-noli)

Inyección para uso subcutáneo
280 mg/2 mL vial

Para adultos con

MIASTENIA GRAVE GENERALIZADA (MGg)



GUÍA PARA CUIDADORES

Esta guía contiene consejos para ayudarlo a cuidar de su ser querido con MGg, mantenerlo informado antes de hablar con el médico y saber más sobre RYSTIGGO.

INDICACIÓN

RYSTIGGO es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos que padecen una enfermedad llamada miastenia grave generalizada (MGg) con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (anti-AChR) o anticuerpos contra la tirosina quinasa muscular (anti-MuSK).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones y podría causar meningitis aséptica. Si presenta signos o síntomas de una infección o de meningitis aséptica durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. También puede causar hinchazón y sarpullido. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO son dolor de cabeza, infecciones, diarrea, fiebre, reacciones de hipersensibilidad y náuseas.


Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 9 y 10, y la Información de prescripción completa adjunta.

La flexibilidad es importante al momento de cuidar de su ser querido

Como cuidador de su ser querido con MGg, tanto su papel como su rutina diaria pueden cambiar

En cualquier día, es posible que usted:

- Ayude a su ser querido con tareas diarias tales como bañarse, trasladarse o comer
- Brinde apoyo emocional durante los días difíciles
- Controle los cronogramas de infusión y preste ayuda durante los días de infusión
- Ayude a controlar los efectos secundarios del tratamiento
- Preste apoyo de urgencia ante los síntomas debilitantes de la MGg, como los problemas respiratorios



En las páginas siguientes, aprenderá más sobre una alternativa de tratamiento que podría ayudar a su ser querido con MGg.

Cómo brindar apoyo a personas que viven con MGg

Su especial papel como cuidador

La MGg es una enfermedad impredecible que tiene síntomas debilitantes y fluctuantes. Cada persona sufre la MGg de manera distinta; es posible que algunos necesiten más apoyo que otros. En ciertos días, es posible que deba ayudar a su ser querido con medicamentos, apoyo emocional o ambas cosas.

Debido a las fluctuaciones y los brotes de la MGg, es posible que su ser querido presente:

- **Debilidad muscular grave e impredecible:** Esto puede causar problemas con las actividades de la vida diaria. Tal vez deba comprobar si a su ser querido le cuesta pararse de la silla, tragar, hablar o cepillarse el cabello o los dientes
- **Dificultad para respirar:** En algunos casos, la MGg puede afectar los músculos de la respiración. Su ser querido puede necesitar monitoreo y ayuda en caso de urgencia, como durante una crisis miasténica

Durante las crisis miasténicas y/o las emergencias médicas:

- Busque ayuda médica de inmediato
- Siga todos los protocolos de emergencia que el médico de su ser querido le haya indicado



Diferencia entre crisis miasténica y brote miasténico

Una **crisis miasténica** es una debilidad potencialmente mortal en los músculos que controlan la respiración. Se trata de una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato. Un **brote** (también llamado exacerbación) es un empeoramiento de los síntomas de MG y/o de la gravedad de los mismos. Puede resultar incómodo, pero no suele ser una emergencia.

Para cuidar de su ser querido, comience por cuidarse usted

Es importante que se cuide mientras cuida de su ser querido. Siga algunos de estos consejos:

- **Grupos de apoyo de MG:** Busque grupos de apoyo, los cuales ofrecen educación acerca de la MG y ayuda para los cuidadores
- **Cuidados físicos:** Duerma bien, coma sano y haga ejercicio
- **Cuide su salud mental:** Para descansar, realice actividades que disfrute durante el día, hable con un terapeuta o tómese un tiempo para hacer vida social con sus amigos o familiares



¿Dónde puedo encontrar apoyo a nivel local?

Para conectarse con organizaciones de defensa y apoyo al paciente en su área, envíe un correo electrónico al equipo de apoyo de UCB a MGAdvocacy@ucb.com.

RYSTIGGO se estudió en un ensayo clínico grande (200 participantes) específico para personas con MGg

Para entender mejor los resultados del ensayo clínico, debe saber cómo se diseñó.

95%

de las personas con MGg tienen anticuerpos anti-AChR o anti-MuSK

El ensayo clínico de RYSTIGGO incluyó a adultos con MGg que tenían anticuerpos anti-AChR o anti-MuSK

Las 200 personas se dividieron en 3 grupos:

- Quienes tomaban 7 mg/kg de RYSTIGGO (66 personas)
- Quienes tomaban 10 mg/kg de RYSTIGGO (67 personas)
- Quienes tomaban el placebo (67 personas)

Las personas del estudio:

- Recibieron 1 dosis por semana durante **6 semanas**, aparte de su tratamiento actual para la MGg
- Se sometieron a un período de tratamiento de 6 semanas seguido de un período de observación de **hasta 8 semanas**

UCB agradece a todos los médicos, a los miembros del personal de enfermería y a las personas que viven con MGg que participaron en este ensayo.

Resultados del ensayo clínico de RYSTIGGO



Mejora significativa en las actividades de la vida diaria

RYSTIGGO mejoró de manera significativa la realización de las actividades de la vida diaria, como respirar, hablar, tragar y poder levantarse de una silla*.

* Determinado según la mejora en el puntaje de las actividades de la vida diaria con miastenia grave (MG-ADL) desde el inicio hasta el Día 43 del estudio; -3.4 puntos en el grupo que recibió RYSTIGGO (133 personas) en comparación con -0.8 en el grupo que recibió el placebo (67 personas).

Los resultados individuales pueden variar y no todas las personas que tomen RYSTIGGO presentarán mejoras.



Hasta el 72 % de las personas respondió al tratamiento

De los participantes del ensayo clínico que recibieron RYSTIGGO, la mayoría notó una mejoría en los síntomas[‡]. Los resultados se deben interpretar con cautela, ya que no se pueden determinar conclusiones. Los resultados pueden variar.

[‡] El 72 % (46 de 64 personas) en el grupo que recibió 7 mg/kg y el 69 % (43 de 62) en el grupo que recibió 10 mg/kg, en comparación con el 31 % (20 de 64) en el grupo que recibió el placebo, determinado según la mejora en el puntaje de MG-ADL desde el inicio hasta el Día 43 del estudio. La respuesta se definió como una mejoría de al menos 2 puntos en el puntaje de MG-ADL desde el inicio hasta el Día 43.



Mejora rápida al final de la Semana 6

Se demostró que RYSTIGGO mejora de manera significativa la realización de las actividades de la vida diaria al final del período de tratamiento de 6 semanas. En algunos participantes, se observaron mejoras incluso 1 semana después de la primera dosis[†].

[†] El 35 % (23 de 66 personas) en el grupo que recibió 7 mg/kg y el 38 % (25 de 66) en el grupo que recibió 10 mg/kg, en comparación con el 24 % (16 de 67) en el grupo que recibió el placebo, determinado según la mejora en el puntaje de MG-ADL.



El primer tratamiento de su tipo para la MGg con anticuerpos anti-MuSK

Los 12 participantes con MGg con anticuerpos anti-MuSK que recibieron RYSTIGGO notaron una mejoría en las actividades de la vida diaria[§]. Los resultados se deben interpretar con cautela, ya que no se pueden determinar conclusiones. Los resultados pueden variar.

[§] Determinado según la mejora en el puntaje de MG-ADL. El estudio no comparó las mejoras de los participantes con anticuerpos anti-MuSK con aquellos que tenían anticuerpos anti-AChR y recibieron RYSTIGGO (120 participantes).

Estos resultados se evaluaron con la escala de actividades de la vida diaria con miastenia grave (MG-ADL). Los participantes del estudio se autocalificaron en 8 actividades funcionales afectadas comúnmente por la MGg. El puntaje total de MG-ADL oscila entre 0 y 24, y los puntajes más altos indican una mayor deficiencia.

RYSTIGGO[®]
(rozanolixizumab-noli)
Inyección para uso subcutáneo
280 mg/2 mL vial

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO son dolor de cabeza, infecciones, diarrea, fiebre, reacciones de hipersensibilidad y náuseas.

Consulte al médico de su ser querido si RYSTIGGO es adecuado para él/ella.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones. En el estudio clínico, las infecciones más comunes fueron las infecciones de las vías respiratorias y las infecciones por herpes simple. El proveedor de atención médica debe controlarlo para detectar si tiene infecciones antes de comenzar el tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento con RYSTIGGO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de infecciones. Si presenta signos o síntomas de una infección durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 9 y 10, y la Información de prescripción completa adjunta.

La seguridad de RYSTIGGO en el ensayo clínico

El 5 % o más de las personas que recibieron RYSTIGGO experimentaron los siguientes efectos secundarios y con mayor frecuencia que los que recibieron el placebo.

Efectos secundarios	RYSTIGGO (133 personas)	Placebo (67 personas)
Dolor de cabeza	44 %	19 %
Cualquier infección	23 %	19 %
Infección de las vías respiratorias superiores	8 %	6 %
Diarrea	20 %	13 %
Fiebre	17 %	2 %
Reacciones de hipersensibilidad	11 %	5 %
Náuseas	10 %	8 %
Reacciones en el lugar de la administración	8 %	3 %
Dolor abdominal	8 %	6 %
Dolor/rigidez en las articulaciones	7 %	3 %

RYSTIGGO[®]
(rozanolixizumab-noli)
Inyección para uso subcutáneo
280 mg/2 mL vial

Consulte la información de seguridad importante completa en las páginas 9 y 10, y la Información de prescripción completa adjunta.



¿Puede RYSTIGGO ser una alternativa de tratamiento para su ser querido?

Aliéntelo a hablar con su médico para saber más.

Información de seguridad importante e Indicación

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO SABER SOBRE RYSTIGGO (rozanolixizumab-noli)?

RYSTIGGO puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Infección:** RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones. En los estudios clínicos, las infecciones más comunes fueron las infecciones de las vías respiratorias superiores, las infecciones por COVID-19, las infecciones de las vías urinarias y las infecciones por herpes simple. El proveedor de atención médica debe controlarlo para detectar si tiene infecciones antes de comenzar el tratamiento y durante el tratamiento con RYSTIGGO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de infecciones. Si presenta signos o síntomas de una infección durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. Algunos de los signos y síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, micción frecuente y/o dolorosa, tos, secreción nasal, sibilancias, dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, flema excesiva, dolor de espalda y/o dolor de pecho.
- **Meningitis aséptica:** RYSTIGGO podría causar meningitis aséptica. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta algún signo o síntoma de meningitis durante el tratamiento con RYSTIGGO, como dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, somnolencia, fiebre, sensibilidad a la luz, movimientos oculares dolorosos, náuseas y vómitos.
- **Reacciones de hipersensibilidad:** RYSTIGGO puede causar hinchazón y sarpullido. El proveedor de atención médica debe monitorearlo durante y después del tratamiento, y suspender RYSTIGGO si fuera necesario. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Antes de recibir RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus enfermedades, lo que incluye si:

- Tiene antecedentes de infecciones o cree que tiene una infección activa
- Recibió una vacuna (inmunización) o tiene previsto recibir una. No se ha estudiado el uso de vacunas durante el tratamiento con RYSTIGGO y se desconoce la seguridad con vacunas de virus vivos o atenuadas. No se recomienda la administración de vacunas de virus vivos o atenuadas durante el tratamiento con RYSTIGGO. Se recomienda la administración de las vacunas apropiadas para la edad según las pautas de vacunación antes de comenzar un nuevo ciclo de tratamiento con RYSTIGGO.
- Está embarazada o planea quedar embarazada, o está amamantando o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

RYSTIGGO[®]
(rozanolixizumab-noli)
Inyección para uso subcutáneo
280 mg/2 mL vial

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE RYSTIGGO?

RYSTIGGO puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RYSTIGGO?”

Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO incluyen los siguientes:

- dolor de cabeza
- infecciones
- diarrea
- fiebre
- reacciones de hipersensibilidad
- náuseas

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RYSTIGGO. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Consulte la [Información de prescripción completa adjunta](#) y hable con su proveedor de atención médica sobre su afección o tratamiento. Para obtener más información, visite www.RYSTIGGO.com o llame al 1-844-599-2273.

¿QUÉ ES RYSTIGGO?

RYSTIGGO es un medicamento recetado que se usa para tratar una enfermedad llamada miastenia grave generalizada (MGg) en adultos que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (anti-AChR) o anticuerpos contra la tirosina quinasa muscular (anti-MuSK).

Entender el proceso de infusión

RYSTIGGO se administra una vez por semana en ciclos de 6 semanas

El período de 6 semanas de tratamiento con RYSTIGGO se llama un ciclo de tratamiento. A cada ciclo le sigue un descanso en el tratamiento con RYSTIGGO.

Es posible que la mayoría de las personas deba repetir los ciclos de RYSTIGGO para controlar los síntomas de la MGg.



La frecuencia de los ciclos de tratamiento con RYSTIGGO de su ser querido y la duración de los descansos dependerán de la experiencia individual con el tratamiento y la evaluación médica. Su médico puede brindarle más información sobre la importancia de los tratamientos. RYSTIGGO solo funciona durante el ciclo de tratamiento.



En los estudios clínicos, los participantes iniciaron un promedio de 4 ciclos de tratamiento por año, con un rango de 1 a 7 ciclos.

Para los participantes que iniciaron 4 ciclos, la duración promedio entre el inicio de los ciclos de tratamiento fue de 14 semanas (98 días).

RYSTIGGO[®]
(rozanolixizumab-noli)
Inyección para uso subcutáneo
280 mg/2 mL vial

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO podría causar meningitis aséptica. Si presenta signos o síntomas de meningitis durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Durante el tratamiento con RYSTIGGO

Todas las personas responden al tratamiento de manera diferente, por lo que es importante que ayude a monitorear el progreso de su ser querido. Después de un ciclo de tratamiento, ayúdele a hablar con su médico para determinar si es necesario o cuándo es necesario otro ciclo.



Lleve un control

Puede ayudar a su ser querido a llevar un control de cualquier síntoma de MGg que pueda reaparecer durante los descansos del tratamiento.



Hable

Si su ser querido presenta síntomas o efectos secundarios durante los ciclos de tratamiento o entre estos, hablele a su médico sobre estos.



Planifique

Con la información que ayude a reunir durante el ciclo de tratamiento, el médico de su ser querido puede determinar si comenzará el próximo ciclo de tratamiento con RYSTIGGO. El tiempo exacto dependerá de la evaluación médica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

También puede causar hinchazón y sarpullido. El proveedor de atención médica debe monitorearlo durante y después del tratamiento, y suspender RYSTIGGO si fuera necesario. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 9 y 10, y la Información de prescripción completa adjunta.

Entender el proceso de infusión (continuación)

Una vez que un profesional de atención médica prepara RYSTIGGO, se administra en forma de infusión subcutánea en aproximadamente 15 minutos*

RYSTIGGO es diferente a otros tratamientos para la MGg, como medicamentos orales o infusiones intravenosas (I.V.). RYSTIGGO es una **infusión subcutánea, es decir que se introduce una aguja debajo de la superficie de la piel**†. En las infusiones intravenosas, se introduce una aguja en una vena.

La mayoría de las personas recibirá RYSTIGGO en un centro de infusión o en el consultorio del médico. Es posible que algunas personas puedan recibir el tratamiento en su casa con la ayuda del personal de enfermería‡.

Su ser querido estará en observación mientras se le administre RYSTIGGO y durante 15 minutos después de la infusión. El médico de su ser querido puede brindar más información sobre las infusiones subcutáneas y sobre qué esperar los días de la infusión.

* Hay 3 dosis recomendadas de RYSTIGGO, según el peso corporal. La preparación y el tiempo de la infusión pueden variar según el paciente, la dosis, el proveedor de la infusión y/o la ubicación del proveedor.

† En la parte inferior del abdomen debajo del ombligo. No deben administrarle RYSTIGGO en áreas donde la piel esté sensible, magullada, roja o dura, o donde haya tatuajes, cicatrices o estrías.

‡ Su médico evaluará la elegibilidad para las infusiones en casa y esto puede depender de la cobertura de su seguro.



Antes de que su ser querido reciba RYSTIGGO, debe informar todas las afecciones médicas a su proveedor de atención médica, incluido lo siguiente:

- Si tiene antecedentes de infecciones o cree que tiene una infección activa
- Si recibió alguna vacuna (inmunización) o tiene previsto recibir una
- Si está embarazada o planea quedar embarazada o está amamantando o planea amamantar

Debe informar al proveedor de atención médica de su ser querido sobre todos los medicamentos que toma, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.



Su ser querido siempre debe tomar RYSTIGGO según lo prescrito.

No debe omitir ninguna infusión ni suspender el tratamiento sin hablar con su médico.

RYSTIGGO[®]
(rozanolixizumab-noli)
Inyección para uso subcutáneo
280 mg/2 mL vial

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO son dolor de cabeza, infecciones, diarrea, fiebre, reacciones de hipersensibilidad y náuseas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No se ha estudiado el uso de vacunas durante el tratamiento con RYSTIGGO y se desconoce la seguridad con vacunas de virus vivos o atenuadas. No se recomienda la administración de vacunas de virus vivos o atenuadas durante el tratamiento con RYSTIGGO. Se recomienda la administración de las vacunas apropiadas para la edad según las pautas de vacunación antes de comenzar un nuevo ciclo de tratamiento con RYSTIGGO.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 9 y 10, y la Información de prescripción completa adjunta.



Descubra apoyo personalizado diseñado para quienes viven con MGg

ONWARD™ se creó con la ayuda de pacientes con enfermedades raras y proveedores de atención médica.

Una vez que le receten RYSTIGGO, su ser querido podrá iniciar una experiencia de apoyo que lo acompañará en cada paso del camino.



ONWARD ofrece lo siguiente:



Un coordinador de atención de ONWARD con formación médica que se le asigna personalmente a su ser querido*.



Ayuda para revisar la cobertura de su seguro y las posibles opciones de asistencia económica, incluso si su ser querido no tiene seguro.



Herramientas y recursos para ayudar a la persona a su cargo a comenzar el tratamiento y continuarlo según lo prescrito.



Orientación para realizar el control de los síntomas y apoyo para el tratamiento en curso.

* Los coordinadores de atención de ONWARD no brindan asesoramiento médico y derivarán a su ser querido a su profesional de atención médica si usted tiene alguna pregunta relacionada con su plan de tratamiento.



Únase al programa de apoyo ONWARD

Pídale al médico de su ser querido que lo inscriba, **escanee el código QR para descargar** el formulario de inscripción o llame al **1-844-ONWARD-1** para más información.

ONWARD se brinda como un servicio de UCB y tiene como objetivo apoyar el uso adecuado de los medicamentos de UCB. ONWARD se puede modificar o cancelar en cualquier momento sin previo aviso. Es posible que se apliquen algunas restricciones al programa y a la elegibilidad.

Recursos útiles y apoyo

Su fuente de educación para el tratamiento, conexión y más

RYSTIGGO.com cuenta con recursos para ayudar a quienes viven con MGg y a sus cuidadores a saber más sobre la MGg y el tratamiento con RYSTIGGO.



Nuestra **Guía para hablar con el médico** puede ayudar a su ser querido a prepararse para las citas médicas.



La **herramienta MG-ADL y usted** explica más a fondo el valor de la evaluación de la escala MG-ADL.



Para quienes buscan apoyo adicional, están los enlaces a **la comunidad de la MGg y grupos de apoyo**.

Visite [RYSTIGGO.com/resources](https://www.rystiggo.com/resources) para saber más.



Si su ser querido no conoce RYSTIGGO y busca un centro de infusión cercano, nuestra **herramienta para Encontrar un centro de infusión** puede servir.

Visite [RYSTIGGO.com/infusion-finder](https://www.rystiggo.com/infusion-finder) para comenzar.

La herramienta para Encontrar un centro de infusión tiene únicamente fines informativos. Consulte con el proveedor de atención médica de su ser querido para saber cuál es el mejor lugar para recibir infusiones. La inclusión en esta lista no es garantía de que su plan de seguro médico cubrirá el tratamiento. Comuníquese con el proveedor de su seguro médico antes de comenzar el tratamiento en un centro de infusión.



Anticuerpo contra el receptor de acetilcolina (AChR): proteína que se encuentra en la sangre de muchas personas con MG o MGg. El anticuerpo AChR afecta las señales que se envían desde los nervios hacia los músculos.

Anticuerpo: proteína que forma parte del sistema inmunitario. Cuando funciona de manera normal, los anticuerpos lo protegen atacando a las sustancias extrañas que ingresan al cuerpo, tales como bacterias y virus.

Enfermedad autoinmunitaria: condiciones en las cuales el sistema inmunitario ataca por error las células, los tejidos y las estructuras sanas del organismo.

Sistema inmunitario: sistema que protege al cuerpo contra las infecciones y enfermedades mediante células y órganos especializados.

Infusión: método para administrar un medicamento al cuerpo. Las infusiones pueden ser intravenosas (en una vena) o subcutáneas (bajo la piel) y las suele administrar un profesional de la salud mediante una bomba de infusión para regular la velocidad a la cual se administra el medicamento.

Intravenosa (I.V.): a través de una vena. Algunos tratamientos de infusión se administran mediante infusiones intravenosas.

Brote de MG: empeoramiento de los síntomas de MG y/o aumento de la gravedad de los síntomas que puede afectar los músculos del cuerpo. Quienes sufren brotes no suelen requerir respiración asistida.

Tirosina cinasa específica del músculo (MuSK): tipo de anticuerpo capaz de alterar la comunicación entre el nervio y el músculo, lo cual puede provocar síntomas de MGg. Una pequeña cantidad de personas con MGg tienen anticuerpos contra la MuSK.

Escala de actividades de la vida diaria con miastenia grave (MG-ADL): cuestionario de 8 categorías que mide cuánto afectan los síntomas de la MGg a ciertas actividades funcionales de la vida diaria, tales como respirar, hablar, masticar, tragar y acciones como cepillarse los dientes y pararse de la silla, además de la visión doble y el párpado caído. El puntaje va de 0 a 24; un mayor puntaje de MG-ADL indica síntomas más graves de MG.


Crisis miasténica: complicación potencialmente mortal de la MG que se caracteriza por una debilidad grave de los músculos que controlan la respiración, lo cual provoca una insuficiencia respiratoria que requiere intubación y ventilación mecánica.

RYSTIGGO® (rozanolixizumab-noli)

Inyección para uso subcutáneo
280 mg/2 mL vial



Consulte al médico de su ser querido si
RYSTIGGO es adecuado para él/ella



¿Quiere saber aún más sobre RYSTIGGO?

Escanee el código QR que se encuentra a la izquierda para inscribirse para recibir correos electrónicos o visite [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com). Recibirá:

- Recursos educativos
- Herramientas diseñadas para ayudarlo a hablar con su médico sobre RYSTIGGO
- Apoyo para el tratamiento
- Información útil para conectarse con la comunidad MGg

INDICACIÓN

RYSTIGGO es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos que padecen una enfermedad llamada miastenia grave generalizada (MGg) con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (anti-AChR) o anticuerpos contra la tirosina quinasa muscular (anti-MuSK).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones y podría causar meningitis aséptica. Si presenta signos o síntomas de una infección o de meningitis aséptica durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. También puede causar hinchazón y sarpullido. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO son dolor de cabeza, infecciones, diarrea, fiebre, reacciones de hipersensibilidad y náuseas. Le alentamos a que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede informar de los efectos secundarios a UCB, Inc. llamando al 1-844-599-CARE [2273].

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 9 y 10, y la Información de prescripción completa adjunta.



RYSTIGGO® es una marca registrada y ONWARD™ es una marca comercial del grupo UCB.
©2024 UCB, Inc., Smyrna, GA 30080. Todos los derechos reservados. US-RZ-2400090