

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use  
140 mg/mL

**LLEGUE  
MÁS LEJOS**  
con RYSTIGGO\*

Para adultos con **MIASTENIA  
GRAVE GENERALIZADA (MGg)**

## **GUÍA PARA CUIDADORES**

Utilice esta guía para obtener consejos sobre cómo ayudar a su ser querido con MGg.

\* Basado en los resultados de MG-ADL y QMG en el día 43 frente a placebo en el ensayo clínico MycarinG. Los resultados pueden variar. No se realizaron ensayos comparativos directos. MG-ADL = actividades de la vida diaria con miastenia grave; QMG=miastenia grave cuantitativa.

### **INDICACIÓN**

RYSTIGGO es un medicamento recetado que se usa para tratar una enfermedad llamada miastenia grave generalizada (MGg) en adultos positivos para anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (anti-AChR) o positivos para anticuerpos contra la tirosina cinasa muscular (anti-MuSK).

### **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE**

RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones y podría causar meningitis aséptica. Si presenta signos o síntomas de una infección o de meningitis durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. También causa hinchazón y sarpullido. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO son dolor de cabeza, infecciones, diarrea, fiebre, reacciones de hipersensibilidad y náuseas.

Consulte la **Información de seguridad importante completa** en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).



# Cómo brindar apoyo a personas que viven con MGg

## Como cuidador de su ser querido con miastenia grave generalizada (MGg), tanto su papel como su rutina diaria pueden cambiar

### En cualquier día, es posible que usted:

- Ayude a su ser querido con tareas diarias tales como bañarse, trasladarse o comer.
- Brinde apoyo emocional durante los días difíciles.
- Controle los cronogramas de infusión y preste ayuda durante los días de infusión.
- Ayude a controlar los efectos secundarios del tratamiento.
- Preste apoyo de urgencia ante los síntomas debilitantes de la MGg, como los problemas respiratorios.

### Acerca de la MGg y su papel como cuidador

La miastenia grave generalizada, o MGg, es un tipo grave de miastenia grave (MG) que puede debilitar los músculos de todo el cuerpo. La MGg es impredecible y presenta síntomas debilitantes y fluctuantes.

Cada persona sufre la MGg de manera distinta; es posible que algunas necesiten más apoyo que otras. En ciertos días, es posible que deba ayudar a su ser querido con medicamentos, apoyo emocional o ambas cosas.

### Debido a las fluctuaciones y los brotes de la MGg, es posible que su ser querido presente:

- **Debilidad muscular grave e impredecible:** Esto puede causar problemas con las actividades de la vida diaria. Tal vez deba comprobar si a su ser querido le cuesta pararse de la silla, tragar, hablar o cepillarse el cabello o los dientes.
- **Dificultad para respirar:** En algunos casos, la MGg puede afectar los músculos de la respiración. Su ser querido puede necesitar monitoreo y ayuda en caso de urgencia, como durante una crisis miasténica.

# Cómo brindar apoyo a personas que viven con MGg

## Durante las crisis miasténicas y/o las emergencias médicas:

- Busque ayuda médica de inmediato.
- Siga todos los protocolos de emergencia que el médico de su ser querido le haya indicado.



### Diferencia entre crisis miasténica y brote miasténico

Una **crisis miasténica** es una debilidad potencialmente mortal en los músculos que controlan la respiración, que puede provocar una falla respiratoria. Se trata de una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato.

Un **brote de MG** (también llamado exacerbación) es un empeoramiento de los síntomas de MG y/o un aumento en la gravedad de los síntomas que puede afectar los músculos en todo el cuerpo. Puede resultar incómodo, pero no suele ser una emergencia. Quienes sufren brotes no suelen requerir respiración asistida.

## Para cuidar de su ser querido, comience por cuidarse usted

Es importante que se cuide mientras cuida de su ser querido. Tenga en cuenta algunos de estos consejos:

- **Grupos de apoyo de MG:** Busque grupos de apoyo, los cuales ofrecen educación acerca de la MG y ayuda para los cuidadores.
- **Cuidados físicos:** Duerma lo suficiente, coma sano y haga ejercicio.
- **Cuide su salud mental:** Tómese un descanso durante el día para hacer cosas que disfrute, hablar con un terapeuta o tratar de hacer tiempo para socializar con amigos u otros miembros de la familia.



### ¿Dónde puedo encontrar apoyo a nivel local?

El equipo de apoyo de UCB puede ayudarlo a ponerse en contacto con organizaciones de apoyo y defensa de pacientes en su área. Envíe un correo electrónico a [MGAdvocacy@ucb.com](mailto:MGAdvocacy@ucb.com)

**En las páginas siguientes, aprenderá más sobre una alternativa de tratamiento que podría ayudar a su ser querido con MGg.**

# Resultados del ensayo clínico RYSTIGGO

## RYSTIGGO se estudió en un ensayo clínico grande (200 participantes) específico para personas con MGg.

Para entender mejor los resultados del ensayo clínico, debe saber cómo se diseñó.

El ensayo clínico de RYSTIGGO incluyó a adultos con MGg que tenían anticuerpos anti-AChR o anti-MuSK.

### Las 200 personas se dividieron en 3 grupos:

Quienes tomaron 7 mg/kg de RYSTIGGO (66 participantes)

Quienes tomaron 10 mg/kg de RYSTIGGO (67 participantes)

Quienes recibieron el placebo (67 participantes)

### Las personas del estudio:

Recibieron 1 dosis por semana durante **6 semanas**, aparte de su tratamiento actual para la MGg.

Además, se sometieron a un período de tratamiento de 6 semanas, con un período de observación de **hasta 8 semanas**.

¿LO SABÍA?

HASTA EL

**95%**

de las personas con MGg

tienen anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina (AChR) o contra el receptor muscular específico tirosina cinasa (MuSK).

### Glosario de la MGg

**Anticuerpo contra el receptor de acetilcolina:** una proteína que se encuentra en la sangre de muchas personas con MGg. El anticuerpo AChR afecta las señales que se envían desde los nervios hacia los músculos.

**Anticuerpo:** una proteína que forma parte del sistema inmunitario. Cuando funciona de manera normal, los anticuerpos lo protegen atacando a las sustancias extrañas que ingresan al cuerpo, tales como bacterias y virus.

**Tirosina cinasa específica del músculo (MuSK):** tipo de anticuerpo capaz de interrumpir la comunicación entre el nervio y el músculo. Una pequeña cantidad de personas con MGg tienen anticuerpos contra la MuSK.

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Inyección For Subcutaneous Use

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](http://RYSTIGGO.com).

# Resultados del ensayo clínico RYSTIGGO



## Mejora significativa en las actividades de la vida diaria

Los participantes que recibieron RYSTIGGO **experimentaron una mejora significativa en MG-ADL** al final del período de tratamiento de 6 semanas.

Determinado según la mejora en el puntaje de las actividades de la vida diaria con miastenia grave (MG-ADL) desde el inicio hasta el Día 43 del estudio; -3.4 puntos en el grupo que recibió RYSTIGGO (133 personas) en comparación con -0.8 en el grupo que recibió el placebo (67 personas).

Los resultados individuales pueden variar y no todas las personas que tomen RYSTIGGO presentarán mejoras.



## Mejora rápida al final de la semana 6

Se demostró que RYSTIGGO mejora de manera significativa los puntajes de MG-ADL al final del período de tratamiento de 6 semanas. En algunos participantes, se observaron mejoras incluso 1 semana después de la primera dosis.

El 35 % (23 de 66 personas) del grupo de 7 mg/kg y el 38 % (25 de 66) del grupo de 10 mg/kg respondieron al tratamiento el día 8, en comparación con el 24 % (16 de 67) del grupo placebo.

### Glosario de la MGg

**Escala de actividades de la vida diaria con miastenia grave (MG-ADL):** un cuestionario que mide cuánto afectan los síntomas de la MGg a 8 actividades funcionales de la vida diaria: respirar, hablar, masticar, tragar, acciones como cepillarse los dientes y pararse de la silla, visión doble y párpado caído. El puntaje total oscila entre 0 y 24; un puntaje de MG-ADL más bajo indica menos deterioro.



**UCB agradece** a todas las personas que viven con MGg y a los médicos y enfermeros que participaron en este ensayo.

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO son dolor de cabeza, infecciones, diarrea, fiebre, reacciones de hipersensibilidad y náuseas.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).

# Resultados del ensayo clínico RYSTIGGO®



## El primer tratamiento de su tipo para la MGg con anticuerpos anti-MuSK

Los 12 participantes con MGg con resultados positivos para anticuerpos anti-MuSK que recibieron RYSTIGGO mejoraron sus puntuaciones de MG-ADL.

Los resultados se deben interpretar con cautela, ya que no se pueden determinar conclusiones. Los resultados pueden variar.

El estudio no comparó las mejoras de los participantes con anticuerpos anti-MuSK con aquellos que tenían anticuerpos anti-AChR y recibieron RYSTIGGO (120 participantes).



## Más del 25 % de los participantes que recibieron RYSTIGGO en el ensayo clínico alcanzaron la expresión mínima de síntomas

La expresión mínima de síntomas (MSE) a veces se utiliza como un objetivo de tratamiento para la MGg y se define como una puntuación total de MG-ADL de 0 o 1. Las personas que alcanzan la MSE experimentan síntomas mínimos según la evaluación de la escala de MG-ADL.

La MSE fue un resultado exploratorio en el ensayo clínico, no un resultado primario o secundario. Los resultados se deben interpretar con cautela, ya que no se pueden determinar conclusiones. Los resultados pueden variar.

El 26 % (17 de 66 personas) en el grupo de 7 mg/kg y el 28 % (19 de 67 personas) en el grupo de 10 mg/kg, en comparación con el 3 % (2 de 67 personas) en el grupo placebo.

**Consulte al médico de su ser querido si RYSTIGGO es adecuado para él/ella.**

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones. En los estudios clínicos, las infecciones más comunes fueron las infecciones de las vías respiratorias superiores, las infecciones por COVID-19, las infecciones de las vías urinarias y las infecciones por herpes simple. El proveedor de atención médica debe controlarlo para detectar si tiene infecciones antes de comenzar el tratamiento y durante el tratamiento con RYSTIGGO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de infecciones. Si presenta signos o síntomas de una infección durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](#).

# La seguridad de RYSTIGGO en el ensayo clínico

## Efectos secundarios en el ensayo clínico

Esta tabla incluye los efectos secundarios que experimentaron al menos el 5 % de las personas tratadas con RYSTIGGO durante el ensayo clínico. También se presentaron con mayor frecuencia en el grupo de RYSTIGGO que en el grupo placebo.

Efecto secundario	RYSTIGGO (133 personas)	Placebo (67 personas)
Dolor de cabeza	44 %	19 %
Cualquier infección	23 %	19 %
Infección de las vías respiratorias superiores	8 %	6 %
Diarrea	20 %	13 %
Fiebre	17 %	2 %
Reacciones de hipersensibilidad	11 %	5 %
Náuseas	10 %	8 %
Reacciones en el lugar de la administración	8 %	3 %
Dolor abdominal	8 %	6 %
Dolor/rigidez en las articulaciones	7 %	3 %



Anime a su ser querido a preguntarle a su médico sobre RYSTIGGO y sus objetivos de tratamiento.

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](http://RYSTIGGO.com).

# Entender el proceso de infusión

## Su ser querido recibirá una dosis por semana durante 6 semanas consecutivas

Este período de 6 semanas se llama **ciclo de tratamiento**. A cada ciclo le sigue un descanso. La duración del descanso es única para cada persona que recibe el tratamiento con RYSTIGGO.



\* En el estudio a largo plazo, el tiempo mínimo entre el inicio de los ciclos de tratamiento fue de 9 semanas (63 días). No hay información de seguridad en cuanto a comenzar ciclos posteriores antes de los 63 días desde el inicio del ciclo anterior.

Debido a que cada persona responde a RYSTIGGO de manera diferente, la duración del descanso del tratamiento será específica para las necesidades de tratamiento individuales de su ser querido, y su médico puede ajustarla después de cualquier tratamiento futuro con RYSTIGGO.

Su ser querido siempre debe tomar RYSTIGGO según lo prescrito. Incluso si su ser querido comienza a sentirse mejor, no debe omitir una infusión ni interrumpir el tratamiento sin hablar con su médico.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO podría causar meningitis aséptica. Si presenta signos o síntomas de meningitis durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](http://RYSTIGGO.com).

# Entender el proceso de infusión



## Durante la pausa del tratamiento:

Es importante ayudar a controlar el progreso de su ser querido. Después de un ciclo de tratamiento, ayúdele a hablar con su médico para determinar si es necesario o cuándo es necesario otro ciclo.



### Lleve un control

RYSTIGGO® (rozanolixizumab-noli) funciona solo durante un ciclo de tratamiento, por lo que es importante estar atento a cualquier síntoma que pueda regresar durante el descanso del tratamiento.



### Hable

Manténgase en contacto con el médico durante el tratamiento y el descanso, y asegúrese de mencionar cualquier efecto secundario o síntoma que observe.



### Planifique

El médico de su ser querido utilizará la información que usted o su ser querido proporcionen, junto con la evaluación médica, para determinar si se necesitan ciclos adicionales de RYSTIGGO y cuándo comenzarlos.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO puede causar hinchazón y erupción. El proveedor de atención médica debe controlarlo durante y después del tratamiento, y suspender RYSTIGGO si fuera necesario. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).

# Entender el proceso de infusión

Una vez que un profesional de atención médica prepara RYSTIGGO, se administra en aproximadamente 15 minutos\*:



- Como es una infusión subcutánea, se introduce una aguja debajo de la superficie de la piel.<sup>†</sup>
- En un centro de infusión, consultorio médico o clínica ambulatoria de un hospital. También pueden estar disponibles infusiones en el hogar con la asistencia de un enfermero.<sup>‡</sup>
- Seguidas de un período adicional de 15 minutos para monitoreo de rutina, una vez que se completa la infusión.

El médico de su ser querido puede brindar más información sobre las infusiones subcutáneas y sobre qué esperar los días de la infusión.

\* Hay 3 dosis recomendadas de RYSTIGGO, según el peso corporal. El tiempo de preparación e infusión pueden variar según el paciente, la dosis y/o el proveedor de la infusión o la ubicación del proveedor.

<sup>†</sup> En la parte inferior del abdomen debajo del ombligo. No deben administrarle RYSTIGGO en áreas donde la piel esté sensible, magullada, roja o dura, o donde haya tatuajes, cicatrices o estrías.

<sup>‡</sup> Las infusiones en el hogar, con asistencia de enfermería, están disponibles según la determinación de elegibilidad del seguro.

## Glosario de la MGg

**Infusión:** método para administrar un medicamento al cuerpo. Las infusiones subcutáneas (debajo de la piel) generalmente se administran por un profesional de la salud mediante una bomba de infusión para regular la velocidad a la cual se administra el medicamento.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No se ha estudiado el uso de vacunas durante el tratamiento con RYSTIGGO y se desconoce la seguridad con vacunas de virus vivos o atenuadas. No se recomienda la administración de vacunas de virus vivos o atenuadas durante el tratamiento con RYSTIGGO. Se recomienda la administración de las vacunas apropiadas para la edad según las pautas de vacunación antes de comenzar un nuevo ciclo de tratamiento con RYSTIGGO.

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).

# Entender el proceso de infusión



**Antes de que su ser querido reciba RYSTIGGO® (rozanolixizumab-noli), debe informar todas las afecciones médicas a su proveedor de atención médica, incluido lo siguiente:**

- Si tiene antecedentes de infecciones o cree que tiene una infección activa.
- Recibió una vacuna (inmunización) o tiene previsto recibir una.
- Está embarazada o planea quedar embarazada, o está amamantando o planea amamantar.
- Está tomando algún medicamento, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.



Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](http://RYSTIGGO.com).

# Recursos útiles y apoyo

## RYSTIGGO.com es su fuente de educación sobre tratamientos, conexión y más



### Encuentre recursos educativos

Descargue la Guía de Diálogo con el Médico, la herramienta de MG-ADL y otros recursos útiles.



### Encuentre un médico cerca de usted

Use el localizador de médicos en línea para ayudar a su ser querido a encontrar un médico con experiencia en MGg en su área.

Los resultados que se muestran pueden no incluir a todos los proveedores de su área. UCB, Inc. no garantiza la precisión o integridad de la información proporcionada en este documento. Comuníquese directamente con los proveedores en relación con cualquier tratamiento, cobertura de seguro, instalaciones u otras consultas específicas del sitio.



### Encuentre un centro de infusión cerca de usted

Si su ser querido está buscando un centro de infusión cercano, [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com) puede ayudarlo a comenzar.

La herramienta para Encontrar un centro de infusión tiene únicamente fines informativos. Consulte con el proveedor de atención médica de su ser querido para saber cuál es el mejor lugar para recibir infusiones. La inclusión en esta lista no es garantía de que su plan de seguro médico cubrirá el tratamiento. Comuníquese con el proveedor de su seguro médico antes de comenzar el tratamiento en un centro de infusión.



### Conéctese con la comunidad de MGg

Comuníquese con los grupos de apoyo de MGg y obtenga más información sobre las organizaciones locales que podrían ayudar.



### Comparta su historia de RYSTIGGO

Descubra cómo su historia puede ayudar a inspirar a otros cuidadores de personas con MGg visitando [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com) o llamando al 833-279-1996.

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](https://www.rystiggo.com) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).

# Descubra apoyo personalizado diseñado para quienes viven con MGg



**ONWARD™ se creó con la ayuda de pacientes con enfermedades raras y proveedores de atención médica.**

Una vez que le receten RYSTIGGO® (rozanolixizumab-noli), su ser querido podrá iniciar una experiencia de apoyo que lo acompañará en cada paso del camino.

## Las ofertas de apoyo personalizadas incluyen:



Un coordinador de atención de ONWARD con formación médica que se le asigna personalmente a su ser querido\*.



Herramientas y recursos para ayudar a la persona a su cargo a comenzar el tratamiento y continuarlo según lo prescrito.



Ayuda para revisar la cobertura de su seguro y las posibles opciones de asistencia económica, incluso si su ser querido no tiene seguro.



Orientación para realizar el control de los síntomas y apoyo para el tratamiento en curso.

\* Los Coordinadores de Atención de ONWARD no brindan asesoramiento médico y lo derivarán a su profesional de atención médica si usted tiene alguna pregunta relacionada con el plan de tratamiento.

ONWARD se brinda como un servicio de UCB y tiene como objetivo apoyar el uso adecuado de los medicamentos de UCB. ONWARD se puede modificar o cancelar en cualquier momento sin previo aviso. Es posible que se apliquen algunas restricciones al programa y a la elegibilidad.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).

# Información de seguridad importante

## ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO SABER SOBRE RYSTIGGO (rozanolixizumab-noli)?

RYSTIGGO puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Infecciones:** RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones. En los estudios clínicos, las infecciones más comunes fueron las infecciones de las vías respiratorias superiores, las infecciones por COVID-19, las infecciones de las vías urinarias y las infecciones por herpes simple. El proveedor de atención médica debe controlarlo para detectar si tiene infecciones antes de comenzar el tratamiento y durante el tratamiento con RYSTIGGO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de infecciones. Si presenta signos o síntomas de una infección durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. Algunos de los signos y síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, micción frecuente y/o dolorosa, tos, secreción nasal, sibilancias, dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, flema excesiva, secreción nasal, dolor de espalda y/o dolor de pecho.
- **Meningitis aséptica:** RYSTIGGO podría causar meningitis aséptica. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta algún signo o síntoma de meningitis durante el tratamiento con RYSTIGGO, como dolor de cabeza severo, rigidez de cuello, somnolencia, fiebre, sensibilidad a la luz, movimientos oculares dolorosos, náuseas y vómitos.
- **Reacciones de hipersensibilidad:** RYSTIGGO puede causar hinchazón y erupción. El proveedor de atención médica debe controlarlo durante y después del tratamiento, y suspender RYSTIGGO si fuera necesario. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Antes de recibir RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus enfermedades, lo que incluye si:

- Tiene antecedentes de infecciones o cree que tiene una infección activa.
- Recibió una vacuna (inmunización) o tiene previsto recibir una. No se ha estudiado el uso de vacunas durante el tratamiento con RYSTIGGO y se desconoce la seguridad con vacunas de virus vivos o atenuadas. No se recomienda la administración de vacunas de virus vivos o atenuadas durante el tratamiento con RYSTIGGO. Se recomienda la administración de las vacunas apropiadas para la edad según las pautas de vacunación antes de comenzar un nuevo ciclo de tratamiento con RYSTIGGO.
- Está embarazada o planea quedar embarazada, o está amamantando o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).

# Información de seguridad importante (continuación)

## ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE RYSTIGGO?

RYSTIGGO puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RYSTIGGO?”

**Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO incluyen los siguientes:**

- dolor de cabeza
- infecciones
- diarrea
- fiebre
- reacciones de hipersensibilidad
- náuseas

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RYSTIGGO. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Le sugerimos que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios a UCB, Inc. llamando al 1-844-599-CARE [2273].

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](http://RYSTIGGO.com) y hable con su proveedor de atención médica sobre su afección o tratamiento. Para obtener más información, visite [RYSTIGGO.com](http://RYSTIGGO.com) o llame al 1-844-599 2273.

## ¿QUÉ ES RYSTIGGO?

RYSTIGGO es un medicamento recetado que se usa para tratar una enfermedad llamada miastenia grave generalizada (MGg) en adultos positivos para anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (anti-AChR) o positivos para anticuerpos contra la tirosina cinasa muscular (anti-MuSK).

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](http://RYSTIGGO.com).

**RYSTIGGO**<sup>®</sup>  
(rozanolixizumab-noli)  
Injection For Subcutaneous Use

# LLEGUE MÁS LEJOS con RYSTIGGO\*

Pregúntele al médico de su ser querido sobre un tratamiento específico para adultos con **MIASTENIA GRAVE GENERALIZADA (MGg)**

\* Basado en los resultados de MG-ADL y QMG en el día 43 frente a placebo en el ensayo clínico MycarinG. Los resultados pueden variar. No se realizaron ensayos comparativos directos.

MG-ADL = actividades de la vida diaria con miastenia grave; QMG=miastenia grave cuantitativa.



Escanee el código QR para inscribirse para recibir correos electrónicos o visite [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com)

## INDICACIÓN

RYSTIGGO es un medicamento recetado que se usa para tratar una enfermedad llamada miastenia grave generalizada (MGg) en adultos positivos para anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (anti-AChR) o positivos para anticuerpos contra la tirosina cinasa muscular (anti-MuSK).

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RYSTIGGO puede aumentar el riesgo de contraer infecciones y podría causar meningitis aséptica. Si presenta signos o síntomas de una infección o de meningitis durante el tratamiento con RYSTIGGO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. También causa hinchazón y sarpullido. Si presenta cualquier reacción adversa después de la administración del medicamento, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. Los efectos secundarios más comunes de RYSTIGGO son dolor de cabeza, infecciones, diarrea, fiebre, reacciones de hipersensibilidad y náuseas. Le sugerimos que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite [www.fda.gov/medwatch](https://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios a UCB, Inc. llamando al 1-844-599-CARE [2273].

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 14 y 15 y la [Información de Prescripción](#) completa en [RYSTIGGO.com](https://www.rystiggo.com).



RYSTIGGO<sup>®</sup> es una marca registrada y ONWARD<sup>™</sup> es una marca comercial del grupo UCB.  
©2024 UCB, Inc., Smyrna, GA 30080. Todos los derechos reservados. US-RZ-2400565

